

各関係機関 御中



石川県農林総合研究センター所長
(公印省略)

病害虫発生予察情報について

令和5年度病害虫発生予察注意報第2号を下記のとおり送付します。

連絡先 石川県農林総合研究センター
総合研究部 病害虫防除室
電話 076-257-6972 (直通)
FAX 076-257-9140
E-mail kisk0301@pref.ishikawa.lg.jp

注意報第2号

シロイチモジヨトウの多発に注意

1 注意報の内容

病虫害名：シロイチモジヨトウ

対象地域：県内全域

発生量：多

2 注意報発表の根拠

- 1) 9月第6半旬のフェロモントラップへの誘殺数は、平年の約7倍となっており多い(図1)。
- 2) 県内での被害が多く報告されている。
- 3) 9月28日付け気象庁の予報によれば、北陸地方の向こう1か月の気温は高いと予想されている。

3 防除上の注意事項

- 1) シロイチモジヨトウ幼虫は、中齢期以降は薬剤抵抗性が強くなり、分散、食入する習性があるのでふ化直後～若齢期に防除する。
- 2) ジアミド系殺虫剤の感受性が低下し、多発すると防除が困難になる場合がある。
- 3) 施設栽培では、開口部に寒冷紗等を設置して成虫の侵入を防止する。

**※ 農薬の使用に当たっては、最新の農薬使用基準を確認し、遵守する。
また、周辺作物への飛散防止に留意する。**

(資料)




図1 フェロモントラップのシロイチモジヨトウ誘殺数 (かほく市内日角)

※平年値は、過去10年 (H25～R4年) の平均