

病害虫防除技術情報第3号

令和7年7月2日
三重県病害虫防除所

**クワシロカイガラムシ第2世代幼虫の発生時期は早いです
適期防除に努めましょう**

1 対象作物:チャ

2 対象病害虫名:クワシロカイガラムシ第2世代幼虫

3 発生状況

有効積算温度による第2世代幼虫ふ化最盛予測日(6月30日予測)は、四日市市水沢町では7月14日(平年7月17日)、亀山市椿世町では7月10日(平年7月17日)、松阪市飯南町粥見では7月10日(平年7月18日)と予想されます(表)。

4 防除対策

(1)防除適期はふ化最盛期です。地域によりふ化時期は異なるので、枝幹につく歩行幼虫を確認して防除してください。

(2)この時期は土着天敵の活動が盛んになる時期です。天敵に対し影響の小さい薬剤を選択してください。

(3)防除の際には、隣接ほ場へのドリフトに十分注意してください。

(4)薬液が枝幹に充分かかるよう専用ノズル等で丁寧に散布して下さい。二番茶の浅刈りせん枝後の防除は薬液が枝にかかりやすく、効果的です。

	ふ化最盛予測日	平年比(日)	防除適期
四日市水沢町	7月14日	-3	7月13~14日
亀山市椿世町	7月10日	-7	7月9~10日
松阪市飯南町粥見	7月10日	-8	7月9~10日

表 クワシロカイガラムシ第2世代幼虫ふ化最盛予測日と防除適期(6月30日予測)

農薬はラベルの表示を確認して、正しく使用してください。

予報発行時のeメール連絡サービス(病害虫情報メール)の登録はこちら→

