

# 令和 8 年産大豆技術情報 第 1 報


ミナミアオカメムシの防除時期となっています！  
紫斑病の防除も併せて実施しましょう！

👉 ミナミアオカメムシに注意！

- ◆ ミナミアオカメムシの防除時期となっています。
- ◆ 莢伸長期（開花 20 日後）と子実肥大期（開花 40 日後）の 2 回防除 を実施しましょう。



ミナミアオカメムシ（左：幼虫、右：成虫）



（参考）三重県農業研究所 研究成果情報（吸蜜性カメムシ類の防除）

<https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000897247.pdf>

（参考）三重県病害虫防除所（吸蜜性カメムシ類の発消長）

<https://www.pref.mie.lg.jp/byogai/hp/89943000001.htm>



農業研究所  
成果情報



病害虫防除所  
発消長

👉 紫斑病の防除も忘れずに！

- ◆ 紫斑病の防除 を行いましょう。
- ◆ 防除適期は、開花後小さい莢がつくようになった頃（開花後 2 週間頃）です。10 日おきに 2～3 回実施しましょう。
- ◆ カメムシ防除と同時に実施すると効率的です。



紫斑病の病徴



紫斑病の病徴

令和8年 9月 11日

三重県産大豆生産振興対策会議