漢方薬

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読みください。

安中散料

安中散料は、「太平恵民和剤局方」を原典とする、胃腸疾患等に用いられる漢方薬です。

⚠ 使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
次の人は服用しないでください
　生後３カ月未満の乳児。

相談すること

1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。
　　むくみ
（6）次の診断を受けた人。
　　高血圧、心臓病、腎臓病

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

関係部位	症　　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　　状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3．１カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

4．長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効能・効果

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

成分と分量

１包（大人１日量）中に次の成分を含んでいます。

成　分	ケイヒ	ボレイ	シュクシャ	エンゴサク	ウイキョウ	カンゾウ	リョウキョウ
分　量	3.0ｇ	3.0ｇ	2.0ｇ	3.0ｇ	2.0ｇ	2.0ｇ	1.0ｇ

用法・用量

本品１包に、水約 500 mL を加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、煎じかすを除き、煎液を３回に分けて食間に服用してください。
上記は大人の１日量です。

年　齢	大人(15才以上)	14才～７才	６才～４才	３才～２才	２才未満	３カ月未満
服用量	上記の通り	大人の２/３	大人の１/２	大人の１/３	大人の１/４以下	服用しないこと
１日服用回数	３回					

＜用法・用量に関連する注意＞
（1）用法・用量を厳守してください。
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
（3）1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
（4）煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
（5）本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

保管及び取扱い上の注意
（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
（2）小児の手の届かない所に保管してください。
（3）他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
（4）煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
（5）生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

■お問い合わせ先

製造販売元

【外部の容器又は外部の被包に記載すべき事項】
注意
1．次の人は服用しないでください
　生後3カ月未満の乳児。
2．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）高齢者。
（4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
（5）次の症状のある人。
　むくみ
（6）次の診断を受けた人。
　高血圧、心臓病、腎臓病
2′．服用が適さない場合があるので、服用前に医師又は薬剤師に相談してください
〔2．の項目の記載に際し、十分な記載スペースがない場合には2′．を記載すること。〕
3．服用に際しては、説明文書をよく読んでください
4．直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
5．小児の手の届かない所に保管してください
6．その他
（1）医薬品副作用被害救済制度に関するお問い合わせ先
　（独）医薬品医療機器総合機構
　http：//www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
　電話　0120-149-931（フリーダイヤル）
（2）この薬に関するお問い合わせ先
　○○薬局
　管理薬剤師：○○○○
　受付時間：○○時○○分から○○時○○分まで（但し○○日は除く）
　電話：03（○○○○）○○○○
　ＦＡＸ：03（○○○○）○○○○