

第2類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

中国の民間話「白蛇伝」  
に登場する女性を伝統的な  
漢方のイメージとしてシン  
ボルマークとしたものです。さい こ けい し とう  
**柴胡桂枝湯**

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D146

本剤は、スッキリ治らない風邪<sup>かぜ</sup>や胃腸の弱っているときに用いられる処方です。

柴胡桂枝湯エキス細粒G「コタロー」は、風邪をひいてしばらくしても、脇の下などに汗をかいていて、微熱が残っていると、頭が重い、はき気がして食欲がないといった治りきらない風邪の方に効果があります。また、イライラして急におなか痛んだり、食欲もなく、はき気があるといった場合にも効果があります。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**次の人は服用しないでください**

生後3ヵ月未満の乳児。

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
むくみ
  - (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(かぜの中期から後期の症状の場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(裏面につづく)

## 【効能・効果】

多くは腹痛を伴う胃腸炎、微熱・寒気・頭痛・はきけなどのある感冒、風邪の後期の症状

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包 または 1.6g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.1g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 0.8g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.5g	
2歳未満	1/4包 または 0.4g	

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】

成分・分量	本剤3包（4.8g）中				
サイコ……………	4.0g	シャクヤク……………	1.6g	タイソウ……………	1.6g
ハンゲ……………	3.2g	オウゴン……………	1.6g	カンゾウ……………	1.2g
ケイヒ……………	2.0g	ニンジン……………	1.6g	ショウキョウ……………	0.4g

より抽出した柴胡桂枝湯エキス(4/5量)3.2gを含有しています。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
（分包剤のみ）
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。  
（大入り剤のみ）
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。  
（大入り剤のみ）



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド  
請求券



D146 A24

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106