

第2類医薬品



漢方製剤

中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

ぼう ふう つう しょう さん  
**防風通聖散**

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D003

**防風通聖散エキス細粒G「コタロー」**は、便秘を改善し、排尿、発汗を促して体内の老廃物を取り去る効果があります。これらにより体調を整え、脂肪が多い肥満体質を改善する処方です。

便秘がちで、特に腹部の皮下脂肪が厚い脂肪太りの方に用いられ、また同時に高血圧に伴う症状がある場合にも効果があります。

**使用上の注意****してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. **本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください**  
他の瀉下薬（下剤）
2. **授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**

**相談すること**

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください**

| 関係部位   | 症 状  |
|--------|--|
| 皮膚     | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器    | 吐き気・嘔吐、食欲不振、*胃部不快感、 <u>腹部膨満</u> 、*はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
| 精神神経系* | <u>めまい</u> *                                     |
| その他*   | 発汗、動悸、むくみ、頭痛*                                    |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状  |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎           | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害           | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

(裏面につづく)

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
下痢、便秘\*
- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：  
 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

### 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
 食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年齢        | 1回量           | 1日服用回数 |
|-----------|---------------|--------|
| 大人（15歳以上） | 1包 または 2.4g   | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包 または 1.6g |        |
| 7歳未満4歳以上  | 1/2包 または 1.2g |        |
| 4歳未満      | 服用しないでください    |        |

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 【成分・分量】

| 成分・分量 本剤3包（7.2g）中 |                     |                  |
|-------------------|---------------------|------------------|
| トウキ……………0.96g     | ショウキョウ……………0.24g    | ビャクジュツ……………1.60g |
| シャクヤク……………0.96g   | ケイガイ……………0.96g      | キキョウ……………1.60g   |
| センキュウ……………0.96g   | ボウフウ……………0.96g      | オウゴン……………1.60g   |
| サンシシ……………0.96g    | マオウ……………0.96g       | カンゾウ……………1.60g   |
| レンギョウ……………0.96g   | ダイオウ……………1.20g      | セッコウ……………1.60g   |
| ハッカ……………0.96g     | 無水硫酸ナトリウム……………0.56g | カッセキ……………2.40g   |

より抽出した水製エキス4.80gを含有しています。

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。  
（分包剤のみ）
- 湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ピンのフタをよくしめてください。  
（大入り剤のみ）
- 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- ピンの「開封年月日」記入欄に、ピンを開封した日付を記入してください。  
（大入り剤のみ）



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
 受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド  
 請求券



D003 A25

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
 TEL 06 (6371) 9106