

第2類医薬品

漢方製剤



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

りょう けい じゅつ かん とう 苓桂朮甘湯

エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D140

本剤は、体調がすぐれず、尿量が減少するなど体内の水分代謝が円滑に行われていない(漢方でいう水毒^{すいどく})方に用いられ、体のバランスを整えていく処方です。

苓桂朮甘湯エキス細粒G「コタロー」は、神経質でストレスがたまりやすく、めまいや動悸^{どうき}、立ちくらみがある方。また頭痛持ちで朝が弱く、ふらつきを覚える方に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：

めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、頭痛、耳鳴り、神経症、神経過敏

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------------|--------|
| 大人（15歳以上） | 1包 または 1.6g | 3回 |
| 15歳未満7歳以上 | 2/3包 または 1.1g | |
| 7歳未満4歳以上 | 1/2包 または 0.8g | |
| 4歳未満2歳以上 | 1/3包 または 0.5g | |
| 2歳未満 | 1/4包 または 0.4g | |

（大入り剤に添付のサジは、大が1.0g、小が0.1gの計量用となっております）

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

| 成分・分量 | 本剤3包（4.8g）中 |
|------------------------------------|-------------|
| ブクリョウ…………… | 4.8g |
| ビャクジュツ…………… | 2.4g |
| カンゾウ…………… | 1.6g |
| ケイヒ…………… | 3.2g |
| より抽出した苓桂朮甘湯エキス（4/5量）1.36gを含有しています。 | |

添加物としてステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、プルラン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
（分包剤のみ）
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
（大入り剤のみ）
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
（大入り剤のみ）



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド
請求券



D140 A24

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106