

第②類医薬品

お子さまのかぜに 小児用かぜ薬

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

小児用エスタックシロップ

S. TAC® SYRUP FOR CHILDREN

小児用エスタックシロップは…

- 発熱・せき・鼻水・鼻づまりなどかぜの諸症状をすみやかに緩和するお子さま用の総合かぜ薬です。
- お子さまが服用しやすいシロップ剤で、有効成分がすみやかに吸収され効果をあらわします。



⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(裏面につづく) ®：登録商標

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

■ 効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

■ 用法・用量

次の1回量を、添付の目盛付コップではかり、いずれも1日3回食後なるべく30分以内に服用し、必要に応じて就寝前にも服用します。

なお、場合により4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年 齢	3才~6才	1才~2才	6カ月~11カ月	3カ月~5カ月	3カ月未満
1回量	8mℓ	6mℓ	4mℓ	2mℓ	服用しないこと

※目盛付コップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3)1才未満の乳児には、止むを得ない場合の他は、服用させないでください。

■ 成分と作用

成 分	48mℓ 中	作 用
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
リン酸ジヒドロコデイン DL-塩酸メチルエフェドリン	8mg 20mg	せきをしずめ、たんを切ります。
マレイン酸クロルフェニラミン	2.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	25mg	頭痛をしずめます。

添加物として、果糖ブドウ糖液糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、塩酸、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、バニリン、香料を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)キャップをしめる際、ビンの口をよく拭いてからしめてください。しめ方が悪いと内容液が漏れ出たり汚染することがあります。

(5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造発売元

エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4