

持続性かぜ薬


新エスタック12

NEW S. TAC-12

効きめが長いから1日2回 —— 朝・夕食後に服用します ——

新エスタック12は、効果が長く続くように工夫された、のみやすい持続性の錠剤ですから、1日2回(朝・夕食後)の服用ですぐれた効果をあらわします。

★新エスタック12が持続性をあらわすしくみ



△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 (眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください

👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)次の症状のある人。高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人。心臓病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。）
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

■ 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の1回量を1日2回、朝・夕食後に服用します。

年齢	成人(15才以上)	11才～14才	7才～10才	7才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分と作用

新エスタック12は、6錠（成人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成分	6錠中	作用
アセトアミノフェン	480mg	熱を下げ、悪寒をとり、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをしずめます。
サリチルアミド	400mg	
クロルフェニラミン マレイン酸塩	5mg	「かぜ」によるアレルギー症状のくしゃみ・鼻水・鼻づまりをおさえます。
ノスカピン塩酸塩水和物	20mg	せきの中枢に作用してせきを止めます。
カフェイン水和物	100mg	頭痛をしずめます。
アスコルビン酸(ビタミンC)	100mg	「かぜ」によるビタミンCの消耗を補います。

添加物として、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ヒマシ油、ポビドン、マクロゴール、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、ステアリン酸Mg、セラック、タルク、酸化チタン、赤色3号、黄色5号を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。(5)ビンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。(6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>

提携

エラン社（アイルランド）