

新エスタック[®]「顆粒」

かぜ薬 葛根湯エキス・ビタミンC配合

- 新エスタック「顆粒」は、かぜの諸症状に効果のある《葛根湯^{かっこんとう}》のエキスをはじめ、熱を下げ痛みを緩和する解熱・鎮痛剤、せきをしずめ、たんを切れをよくする鎮咳去痰剤、くしゃみ・鼻水などアレルギー症状に効く抗ヒスタミン剤、それにかぜをひいたときに消耗しがちなビタミンCなどを配合した顆粒タイプのかぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
- ④ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ⑤ 服用時は飲酒しないでください
- ⑥ 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、甲状腺機能障害
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(裏面につづく)

(表面のつづき)

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくなる場合。

- ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	成 人 (15才以上)	11才~ 14才	7才~ 10才	3才~ 6才	1才~ 2才	1才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	×服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分と作用


新エスタック「顆粒」は、3包(成人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	3包中	作 用
葛根湯エキス カクコン 1.6g、マオウ 0.8g、ケイヒ 0.6g、シャクヤク 0.6g、タイソウ 0.8g、ショウキョウ 0.2g、カンゾウ 0.4gの煎液より製したエキス	3,000mg	古くから「かぜ薬」として知られ、とくにかぜの初期によく用いられる葛根湯のエキスです。発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、せきといったかぜの諸症状に効果をあらわします。
アセトアミノフェン	720mg	熱を下げ、痛みをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめ、たんを切ります。
グアイフェネシン	135mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水・くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめます。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	6mg	かぜをひいたときに消耗しがちなビタミンを補給します。
アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCカルシウム塩)	500mg	

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、白糖、トウモロコシデンプン、サッカリンNa、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4