

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

# エスタックGT<sup>®</sup>「有核」

第2類医薬品

かぜ薬 熱・のどの痛み、鼻水に 早めにかぜ対策！

- エスタックGT「有核」は、熱・のどの痛み・鼻水など、かぜの諸症状によく効く総合かぜ薬です。また、エスタックGT「有核」は、ビタミンCを核錠とし、成分の安定性とのみやすさに配慮した有核錠です。

## ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の方は服用しないでください  
 (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
 (眠気等があらわれることがあります。)
- ④ 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- ⑤ 服用前後は飲酒しないでください
- ⑥ 長期連用しないでください



## 相談すること

- ① 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
 (3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
 (6) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

(裏面に つづく)

(表面のつづき)

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

④5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

### 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	11才～14才	5才～10才	5才未満
1回量	 3錠	 2錠	 1錠	×服用しないこと

### ＜用法・用量に関連する注意＞

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 成 分 9錠(成人1日量)中

アセトアミノフェン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 900mg  
 ジヒドロコデインリン酸塩・・・・・・・・・・・・・・・・ 15mg  
 dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩・・・・・・・・・・・・ 30mg  
 クロルフェニラミンマレイン酸塩・・・・・・・・・・・・ 7.5mg  
 無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75mg  
 リボフラビン(ビタミンB2)・・・・・・・・・・・・・・ 12mg  
 アスコルビン酸(ビタミンC)・・・・・・・・・・・・・・ 500mg  
 添加物：カルメロース、カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポビドン、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、タルク

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ピンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)ピンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193  
 受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元

**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4