

かぜ薬

# 新ベサエース®EV

第2類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 15才未満の小児

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気があらわれることがあります)

#### 4. 服用時は飲酒しないで下さい

#### 5. 5日間を超えて服用しないで下さい



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人: 肝臓病、心臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、甲状腺機能障害、糖尿病、高血圧
- (9) 次の病気にかかったことのある人: 胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎
精神神経系	めまい
その他	目のかすみ、耳なり、排尿困難、むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさを等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvenson-Johnson症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。)
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合(特に熱が3日以上続いたり、又、熱が反復したりするとき)

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

口のかわき、便秘、下痢

## 効能効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	

### <用法用量に関連する注意>

- 用法用量を厳守して下さい。
- カプセルの取り出し方  
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。  
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 成分分量

6カプセル（成人1日量）中

成分	含量	はたらき
イブプロフェン	450mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみ等をおさえます。
チペジジンヒベンズ酸塩	75mg	せきの中枢に作用してせきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきを鎮め、のどを楽にします。
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg	たんの切れを良くします。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
チアミン硝化物（ビタミンB1）	25mg	かぜの時に消耗するビタミン群を補います。
リボフラビン（ビタミンB2）	12mg	

添加物として乳糖、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Naを含有します。

### <成分分量に関連する注意>

配合成分のリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 表示の期限内に服用して下さい。



■お問い合わせ先  
滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話：(0748) 88-3180（大代表）  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

発売元 **ゲンキー株式会社**  
福井県坂井市丸岡町下久米田38-33

製造販売元 **滋賀県製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町滝879