

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

かぜ薬

のど・熱・せきの緩和に

第2類医薬品

セビー® ゴールドカプセル

葛根湯乾燥エキス・消炎酵素剤配合

〔特徴〕 セビーゴールドカプセルは、かぜの諸症状を緩和する総合感冒薬です。



のど



熱



せき

〔炎症をしずめるセミアルカリプロティナーゼ配合〕

〔熱を効果的に下げるACE処方
A：アセトアミノフェン
C：カフェイン
E：エテンザミド〕

〔せき中枢をおさえるジメモルファンリン酸塩配合〕

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
 - 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
 - 服用時は飲酒しないでください
 - 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、血液凝固異常（出血傾向）
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、胃痛
精神神経系	めまい
その他	排尿困難、血痰、倦怠感、はれぼったい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

(必ず裏面もお読みください)

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

□のかわき

〔効能・効果〕

かぜの諸症状（のどの痛み、発熱、せき、たん、悪寒、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人（15才以上）	2カプセル	1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。
15才未満	服用しないでください。	

（用法・用量に関連する注意）

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) (カプセル剤の取り出し方)

右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



〔成 分〕 1日量(6カプセル)中

成 分	分 量	はたらき
セミアルカリプロティナーゼ	60000単位*	のどの炎症を抑え、たんの切れをよくします。
葛根湯乾燥エキス	863mg (原生薬換算5005.4mg)	発汗により解熱効果があります。
アセトアミノフェン	390mg	解熱・鎮痛作用があります。
エテンザミド	300mg	
ジメモルファンリン酸塩	30mg	せきを抑えます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	抗ヒスタミン作用によりくしゃみ、鼻みずを抑えます。
無水カフェイン	30mg	頭痛を和らげます。
ビタミンB ₁ 硝酸塩	12mg	かぜの時に消耗しやすいビタミンを補給します。

(※単位：セミアルカリプロティナーゼ単位)

添加物として、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、乳糖水和物、メタアクリル酸コポリマー、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸、ヒプロメロースフタル酸エステル、軽質無水ケイ酸、ゼラチン、黄色五号、酸化チタン及びラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)

受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

