

2011年3月下線部改訂

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

総合感冒薬

## 新ゴールドゼンク

第②類医薬品

新ゴールドゼンクは、かぜの諸症状に効果のある漢方薬桂枝湯のエキスをはじめ、発熱、頭痛、せき、鼻水などのかぜの諸症状を緩和する成分を配合したかぜくすりです。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

##### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

##### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻  
炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

##### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)

##### 4. 服用時は飲酒しないでください

##### 5. 長期連用しないでください

#### 🗨️ 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

##### (8) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

##### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

###### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(裏面もお読みください。)

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください □のかわき

**効能・効果** かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

**用法・用量** 次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
3才以上 7才未満	1/3包	
1才以上 3才未満	1/4包	
1才未満	服用させないこと	

(用法・用量に関する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

**成分・分量** 3包(成人1日量)中

(1包:2g)

成 分	分量	は た ら き
桂枝湯エキス(乾燥) ( <small>クイヒ 0.8g クイヒョウ 0.8g シヨウキョウ 0.2g</small> シンゴヤク 0.8g)	600mg	古くからかぜ薬として用いられてきた桂枝湯をエキスにしたもので、発熱、悪寒、頭痛、筋肉の痛みなどをやわらげます。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状をやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき中枢にはたらいで、せきをしずめます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	180mg	たんをうすめてだしやすくします。
無水カフェイン	75mg	熱を下げ痛みをやわらげる成分のはたらきを補助します。
ビスベンチアミン	10mg	かぜの際に不足しがちなビタミンB <sub>1</sub> を補給します。
リボフラビン	6mg	かぜの際に不足しがちなビタミンB <sub>2</sub> を補給します。

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、リン酸水素Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメルロースNa、ラウリル硫酸Na、サッカリンNa、デヒドロ酢酸Na、カラメル、ケイヒ油を含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話(076)435-5055 午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

発売元 **中部薬品株式会社**

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**

富山県射水市戸破69-12

富山市草島15-1

NP・AB

5030030122-7