

第②類医薬品

かぜにグットミンカプセルA

発売元
株式会社 米田兄弟社
奈良県磯城郡田原本町304-1

牛黄 配合

第②類医薬品

かぜにグットミンカプセルA
ねっせき・いたみに

12caps



SA47241110621

かぜにグットミンカプセルA 第②類医薬品

品目番号 奈良3巻-82-250

第②類医薬品

販売名 グットミンカプセルA

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量

15歳以上(大人) 1回2カプセル
7歳以上15歳未満 1回1カプセル
1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

注意

1. 次の人は服用しないこと。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
3. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

配置期限 製造番号

成分及び分量 1日量(6カプセル)中

日量 アセトアミノフェン	600mg
日量 エテンザミド	400mg
日量 無水カフェイン	120mg
日量 クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
日量 dl-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg
日量 ノスカピン	32mg
日量 ゴオウ	3mg

添加物として、バレイショデンプン、セルロース及びカプセルに黄色5号、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有する。



成型シート

第②類医薬品

かぜにグットミンカプセルA

かぜにグットミンカプセルA

第②類医薬品

製造販売元
寧薬化学工業株式会社
奈良県大和高田市旭南町2-25
電話 0745-22-4151

12カプセル
¥1,200+税

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931


ご使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい。
また必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンスジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のみくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無 顆 粒 球 症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない 涼しい所に保管すること
- 2.小児の手の届かない所に保管すること
- 3.他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わることがある)



製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**
奈良県大和高田市旭南町2-25

【問い合わせ】電話番号：0745-22-4151
受付時間：9時～16時(土・祝日を除く)

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		