

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

かぜ薬

発熱・せき・たん・鼻水に

ノーパス かぜシロップ 小児用

＜ノーパスかぜシロップ小児用＞は、生薬のカンゾウエキス、ニンジンエキスをはじめ7種類の有効成分を配合した、発熱、せき、たん、鼻水などのかぜの諸症状に効果のあるシロップ剤です。

⚠〔使用上の注意〕

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (5) 次の症状のある人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 高熱、むくみ、排尿困難
(3) 高齢者。 (6) 次の診断を受けた人。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、
肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の 発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、 全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身 のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、 空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋 肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、 動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、 下痢等があらわれる。

裏面も必ずお読みください

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

かぜの諸症状（発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、頭痛、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法・用量〕

次の1回量を食後なるべく30分以内及び必要な場合には就寝前に服用してください。なお、服用の際は、添付の計量カップではかって服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
3歳以上7歳未満	4 mL	3回 また、止むを得ない場合には約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用できます。
1歳以上3歳未満	3 mL	
6ヶ月以上1歳未満	2.4 mL	
3ヶ月以上6ヶ月未満	2 mL	
3ヶ月未満の乳児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 本剤は、小児用ですので、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
4. 本剤は、生後3ヶ月未満の乳児に服用させないでください。

〔成分と作用〕

24mL中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	300 mg	熱を下げ、頭痛や、関節・筋肉の痛みを和らげます。
ジヒドロコデインリン酸塩	8 mg	せきを和らげ、たんを切り取ります。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	20 mg	
カンゾウエキス (原生薬換算量)	416 mg (1664 mg)	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5 mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	25 mg	頭痛を和らげます。
ニンジンエキス (原生薬換算量)	30 mg (201 mg)	かぜの諸症状で弱った身体を回復させ、体調をととのえます。

添加物として、精製白糖、D-ソルビトール液、ポリリン酸ナトリウム、クエン酸水和物、プロピレングリコール、安息香酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、ベンジルアルコール、エチルバニリン、バニリン、香料を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 服用のつどピンの口の周囲をよく拭いてからキャップをしめてください。
5. 計量カップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
6. 使用期限（外箱及び容器に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。また、使用期限内であっても、開栓後はなるべく早く服用してください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

☎0120-415-688

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発 売 元 北日本製薬株式会社
富山県中新川郡上市町若杉55

製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1