

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

柴胡桂枝湯エキス配合かぜ薬 フロンゴールドS

「かぜ」はひきはじめのうちに治すことが大切ですが、無理をして長びいてしまうことも少なくありません。

フロンゴールドSは、柴胡桂枝湯エキスに解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン薬などを配合した顆粒状のかぜ薬で、ひきはじめはもちろん、長びいたかぜにもすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振		
精神神経系	めまい	その他	過度の体温低下

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状（発熱、せき、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の用法・用量を守り、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11歳以上 15歳未満	2/3包	
8歳以上 11歳未満	1/2包	
5歳以上 8歳未満	1/3包	
3歳以上 5歳未満	1/4包	
3歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

フーロンゴールドSは、3包（6g）中に下記の成分・分量を含有します。

成 分 ・ 分 量	は た ら き
柴胡桂枝湯エキス……………1,200mg	発熱、のどの痛み、せき・たんなどのあるかぜに効果があります。
エテンザミド……………450mg	熱を下げ、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます。
アセトアミノフェン……………360mg	
チベピジクエン酸塩……………45mg	せきを抑え、たんを出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン……………150mg	脳血管の緊張をやわらげ、頭痛をしずめます。

添加物として、乳糖、パレイシヨデンプン、ケイ酸Al、メチルセルロースを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤には生薬成分が配合されていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

日本製薬工業株式会社

愛知県小牧市小木東一丁目186