

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要時に読めるよう本剤とともに保管してください。

キキョウ・甘草配合かぜ薬

第②類医薬品

カゼックスSシロップ小児用

“かぜは万病のもと”と昔から言われているように、こじらせると、重い病気の引き金となることがありますので、特にひき始めには、少しでも早く適切な手当てをすることが大切です。カゼックスSシロップ小児用は、キキョウ流エキス、カンゾウエキスの生薬成分にアセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩等5種類の有効成分を配合したかぜ薬です。有効成分のはたらきにより、かぜにより体力が消耗されやすい小児の発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり等の症状の緩和に効果をあらわします。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 服用前後は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 | 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|------|---------|
| 皮膚 膚 | 発疹・発赤、かゆみ | 泌尿器 | 排尿困難 |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 | その他 | 過度の体温低下 |
| 精神神経系 | めまい | | |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症 状 の 名 称 | 症 状 |
|--|--|
| シ ョ ッ ク (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝 機 能 障 害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎 障 害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛 (節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 間 質 性 肺 炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜ ん そ く | 息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再 生 不 良 性 貧 血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。 |
| 無 顆 粒 球 症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、悪寒、頭痛、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の1回量を添付の目盛りつき計量カップではかり、1日3回食後及び必要に応じて就寝前に服用してください。場合によっては1日6回まで服用できますが、その場合には約4時間の間隔をおいてください。

| 年 齢 | 1 回 量 |
|-------------|---------|
| 3歳以上 7歳未満 | 4 mL |
| 1歳以上 3歳未満 | 3 mL |
| 6ヵ月以上 1歳未満 | 2.4 mL |
| 3ヵ月以上 6ヵ月未満 | 2 mL |
| 3ヵ月未満 | 服用しないこと |

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■ 成分・分量

24mL（1日最大服用量）中に次の成分・分量を含有しています。

| 成 分 | 分 量 | は た ら き |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| キキョウ流エキス （キキョウとして） | 0.24 mL (240mg) | たんを切り、せきをしずめます。 |
| カンゾウエキス （カンゾウとして） | 50 mg (200mg) | せきをしずめ、たんを切り、のどの炎症をやわらげます。 |
| アセトアミノフェン | 300 mg | 痛みをおさえ、熱を下げます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 2.4 mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりをおさえます。 |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 8 mg | 咳中枢にはたらき、せきをしずめます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 16 mg | 気管支をひろげ、せきをしずめます。 |
| 無 水 カ フ ェ イ ン | 32 mg | 頭痛をやわらげます。 |

添加物として白糖、D-ソルビトール、グリシン、安息香酸Na、パラベン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、香料、バニリンを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)一度開栓した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■その他

本剤は生薬エキスを配合しているため、沈殿を生じることがありますので、よく振ってから服用してください。

■お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話 0748-52-1232 受付時間 9時～17時（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **日野薬品工業株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町上野田119