

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

柴胡桂枝湯エキス
配合感冒薬**スズレックス顆粒EX**第2類
医薬品

くしゃみ、鼻水、発熱、頭痛など、かぜの症状がではじめたら、こじらせる前にできるだけ早く治すことが大切です。スズレックス顆粒EXは、生薬からなる柴胡桂枝湯エキスと解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤、去痰剤などを効果的に配合した顆粒状のかぜ薬で、かぜの諸症状をやわらげ、健康な体への回復をたずけます。

⚠ 使用上の注意**❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

※(3)12歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)**4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください****5. 服用前後は飲酒しないでください****6. 長期連用しないでください****相談すること****1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3)高齢者。
 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (5)次の症状のある人。
 高熱、排尿困難
 (6)次の診断を受けた人。



甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

(裏面へ続く)



相談すること (おもてより続く)

症状の名称	症 状
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

下記1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15歳以上	1 包	3 回 食 後
12歳以上15歳未満	2/3 包	
12歳未満	服用しないでください	



<用法・用量に関連する注意>

(1)用法及び用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【主成分とその主な作用】 成人1日服用量 3包(1包:1.15g)中に、次の成分を含有します。

成 分	分 量	主 な 作 用
柴胡桂枝湯エキス (柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、人参、大棗、甘草、乾生姜)	760mg (処方換算量 5168mg)	発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、吐き気などのあるかぜに特に効果があります。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、はげしいせきをしずめ、のどを楽にします。
グアヤコールスルホン酸 カリウム	240mg	のどにからむ痰をやわらかくし、出やすくします。
無水カフェイン	75mg	脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をやわらげ、眠気を防止します。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	12mg	ビタミンB ₂ を補給し、体力の回復をたすけます。
合成ケイ酸アルミニウム	1200mg	胃の粘膜を保護し、他成分による胃腸障害をおさえます。


添加物として、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、乳糖、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB₂)により、尿が黄色になることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包の分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

アスゲン製薬株式会社 お客様相談窓口

電話：0572-68-1865

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



アスゲン製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞 2008