


平成 25 年 1 月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

かぜに



第②類医薬品

非ピリン系

ザザは、解熱鎮痛成分のアセトアミノフェンと、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの抑制効果のあるクロルフェニラミンマレイン酸塩など4成分がバランスよく働いて、かぜの諸症状を緩和します。

⚠ 使用上の注意

⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがある。)

4. 服用後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



【相談すること】

1. 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

電話：(076)431-7017 FAX：(076)431-7013

受付時間：午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元：株式会社 延寿堂 (えんじゅどう)

〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発 疹・発 赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み)の緩和

用法・用量

次の量を食後、なるべく30分以内に、服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3 回
11歳以上 15歳未満	2/3包	
7歳以上 11歳未満	1/2包	
3歳以上 7歳未満	1/3包	
1歳以上 3歳未満	1/4包	
1歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止む得ない場合のみ服用させてください。

成分・分量(1日量:1500mg(3包)中)

はたらき	成 分	含 量
熱を下げ、のどの痛み、頭痛、 関節の痛みを和らげる	アセトアミノフェン	600 mg
	エテンザミド	360 mg
鼻水、くしゃみを和らげる	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5 mg
頭痛を和らげる	無水カフェイン	150 mg

※ 添加物としてパレイショデンプンを含む

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折返して保管し、2日以内に服用してください。
 - 期限を過ぎた製品は服用しないでください。