

ピラカッ。 ねつ・せき・いたみ

かぜに

〈総合感冒薬〉

ピラカッ。

非ピリン系感冒剤



ねつ・せき・いたみ

6 cap.

TOYO YAKUHHIN SHOKAI

ピラカッ。

ピラカッ。

かぜ・ねつ・せき

ピラカッ。

6 回分(2日分) 008大

配置期限

製造元 大和製薬株式会社
奈良県吉野郡大淀町土田67

成分及び分量 1日量(3カプセル中)
日局 アセトアミノフェン.....840mg
日局 無水カフェイン.....90mg
日局 アスコルビン酸.....15mg
日局 カルボキシチルシロリン酸.....30mg
日局 結晶セルロース.....15mg
日局 シクロシロリン酸.....12mg
日局 ノスカピン.....24mg
カプセルに青色1号、赤色3号、黄色4号(フトラジン)、黄色5号を含有する。

効能又は効果
かぜの諸症状(鼻水、鼻つまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。
用法及び用量
大人(15才以上) 1回1カプセル
1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。
注(1) 服用後は自動車等の運転をしないこと。
(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
(3) 服用に際して、添付文書をよく読むこと。
(4) 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管すること。

ピラカッ。

〈総合感冒薬〉

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

⚠ かぜ薬 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）。

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続
又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師
に相談すること

口のかわき

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

大和製薬株式会社

お問い合わせ先 ☎0745-66-0112

フータンカプセルG

ピラカップ

パインスターカプセル