

第2類  
医薬品

# かぜに

## 総合感冒薬

非ピリン系(2日分)

# フータン

カプセルG

かぜの  
づつう  
せき  
いたみに

# G

1回1カプセル服用  
(6回分)

第2類医薬品

大和製薬株式会社  
お客様相談窓口 ☎0745-66-0112

かぜに  
フータン  
カプセルG

カプセルG  
フータン  
かぜに  
第2類  
医薬品

第2類  
医薬品

かぜに  
フータン  
カプセルG

第2類  
医薬品

かぜに

フータン  
カプセルG

販売名：フータンカプセルG

第2類医薬品

### 効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 用法及び用量

大人(15才以上)……1回1カプセル  
1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

注  
意

1. 次の人は服用しないで下さい。  
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
3. 服用に際しては、説明文書をよくお読み下さい。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

### 成分分量 1日量(3カプセル)中

日局 アセトアミノフェン…………… 840mg  
日局 無水カフェイン…………… 90mg  
日局 クロルフェニラミンマレイン酸塩 …… 6mg

日局 ノスカピン…………… 24mg  
日局 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 …… 30mg

添加物としてカルメロースカルシウム、パレイシヨデンブ、結晶セルロース、カプセルにゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム、青色1号、赤色3号、黄色4号(タートラジン)、黄色5号を含む。

製造販売元

大和製薬株式会社

奈良県御所市東佐味334-1

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

配置期限



紙 成型シート  
外箱

6カプセル(2日分) ¥800+税

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

## ⚠ かぜ薬 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）。

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気があらわれることがある）

#### 4. 服用時は飲酒しないこと

#### 5. 長期連用しないこと



### ■ 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(8) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

口のかわき

### 【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

大和製薬株式会社  
お問い合わせ先 ☎0745-66-0112

フータンカプセルG  
ピラカップ  
パインスターカプセル