

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品 かぜ薬 とくかぜD錠



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眼気があらわれることがある。)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 授乳中の人は。

(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある
乳・幼・小児(15歳未満)。

(5) 高齢者。

(6) 本人又は家族がアレルギー体质の人。

(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(8) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難

(9) 次の診断を受けた人。

心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病、
高血圧

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色 が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があ らわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプル・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激し い症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があ らわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、 発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と 区別が難しいこともあります。空せき、発熱等の症状が悪化 した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受け ること。)
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた 場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 口のかわき

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

年齢区分	服用量(1回量)	年齢区分	服用量(1回量)
15歳以上	4錠	5歳以上7歳未満	1錠
7歳以上15歳未満	2錠	5歳未満	服用しないこと

1. いずれも1日3回、食後なるべく30分以内に服用すること。
2. 水又はお湯と一緒に服用すること。

(用法・用量に関する注意)

1. 定められた用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 糖衣錠の取り出し方

右図のように糖衣錠の入っているP.T.Pシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。)



【成分・分量】

1日量 12錠 (3,224mg) 中に次の成分を含んでいます。

成 分 名	含 有 量	成 分 名	含 有 量
アセトアミノフェン	450mg	無水カフェイン	120mg
エテンザミド	600mg	ケイヒ末	300mg
クロルフェニラミン マレイン酸塩	7.5mg	ゴオウ	3mg
dl-メチルエフェドリン 塩酸塩	40mg		

添加物として乳糖、カルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、白糖、タルク、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、カルナウバロウを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
4. 使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地

電話番号 0942-92-2303(代)

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)