

効能又は効果  
かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

成分及び分量 1日量(6錠)中  
アセトアミノフェン600mg、ノスカピン30mg、エテンゲミド500mg、d-メチルエフェドリン塩酸塩30mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg、無水カフェイン150mg、添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Da、J-バレイショデンプン、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコールジエチルアミノアセテート、アラビアゴム、タルク、カオリン、炭酸Ca、白糖、酸化チタン、ゼラチン、カルナウバロウを含有。

品目番号 072-91

第②類医薬品

非ピリン系製剤



糖衣錠  
6錠入

用法及び用量  
下記の分量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。  
大人(15才以上)……………1回2錠  
5才以上15才未満……………1回1錠  
5才未満の乳幼児は服用しないこと

用法及び用量に関する注意  
(1)用法及び用量を厳守してください。  
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



製造販売元  
中村薬品工業株式会社  
奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.3番地

1831 0120-49-931 製薬株式会社



服用期間

※0749(67)0098 受付時間10:00~19:00(土、日、祝日を除く)

この薬は、かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和に効果があります。服用期間中は、他の薬を服用しないこと、アルコールを飲まないこと、運転をしないこと、機械を操作しないこと、危険な作業をしないこと、妊娠中または授乳中の方は服用しないこと、5才未満の乳幼児は服用しないこと、5才以上15才未満の方は1回1錠、15才以上の方は1回2錠を服用してください。

Table with 2 columns: 副作用 (Side Effects) and 注意 (Precautions). Side effects include drowsiness, dizziness, and dry mouth. Precautions include avoiding alcohol and driving.

Table with 2 columns: 禁忌 (Contraindications) and 相互作用 (Drug Interactions). Contraindications include severe liver/kidney disease. Interactions include other cold/flu medicines.

この薬は、かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和に効果があります。服用期間中は、他の薬を服用しないこと、アルコールを飲まないこと、運転をしないこと、機械を操作しないこと、危険な作業をしないこと、妊娠中または授乳中の方は服用しないこと、5才未満の乳幼児は服用しないこと、5才以上15才未満の方は1回1錠、15才以上の方は1回2錠を服用してください。