

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要に応じて読み、大切に保管してください。

総合感冒薬 熱救コールド

第②類医薬品
本品の特徴
熱救コールドは、解熱鎮痛作用のあるアセトアミノフェンやエテンザミド、その効果を増強する無水カフェイン、せき中枢に作用して咳を鎮めるdl-メチルエフェドリン塩酸塩やノスカタピエン、のどや喉のアレルギ一症状であるせき・痰・鼻づまりなどを緩和するクロルフェニラミンマインマイン塩酸塩を配合した総合感冒薬です。

⚠ 使用上の注意

- ① してはいいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起これやすくなる)
- ② 1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー一症状を起こしたことがある人。 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 (3) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギ一用薬等)
- ③ 2. 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわられることがある。)
- ④ 3. 服用前後は飲酒しないこと
- ⑤ 4. 長期連用しないこと

相談すること

- ① 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 授乳中の人。 (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。 (5) 高齢者。 (6) 薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人。 (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難 (8) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- ② 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起これることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (SJS/TOCS) 症候群、中毒性表皮壊死剥離症 (TSS) 症候群	高熱、目の赤血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発赤・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る、全身がたれ、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
急性汎発性発疹性膿疱症	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。


症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする。息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のたるさ、関節痛 (節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をとるとせきゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気が悪くなりくらくつする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

効能又は効果
かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量
下記の分量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。
大人(15才以上) 1回2錠 8才以上15才未満 1回1錠
8才未満の乳幼児は服用しないこと

＜用法及び用量に関する注意＞

- ① (1) 用法及び用量を厳守してください。
- ② (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- ③ (3) 錠剤の取出し方:
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分及び分量 1日量 (6錠) 中の成分は次の通り

成 分 名	分 量	成 分 名	分 量
アセトアミノフェン	600mg	ノスカピン	30mg
エテンザミド	500mg	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg
クロルフェニラミンマイン酸塩	7.5mg	無水カフェイン	150mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、バレイシヨテンブ、ステアリン酸Mg、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、アラビヤガム、タルク、カオリン、炭酸Ca、白糖、酸化チタン、ゼラチン、カルナウバロウを含む。

保管及び取扱い上の注意

- ① (1) 直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。
- ② (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- ③ (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になりたり品質が変わる。)
- ④ (4) 表示の期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記までお願い申し上げます。
中村薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話 0745-67-0038 受付時間 10:00~16:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 中村薬品工業株式会社
〒635-0121 奈良県高市郡高取町大字丹生台31.32番地
1204.12000