

# かぜ薬 コン・コール

第②類医薬品

(カプセル製剤)

## △ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください

### ■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある小児(15歳未満)。  
(4)高齢者。(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
(7)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状	関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい	消 化 器	吐き気、嘔吐、食欲不振
泌 尿 器	排尿困難	そ の 他	過度の体温低下		

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 5~6服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 〔成分・分量〕

1日量6カプセル(1カプセル335mg)中

成 分	分 量	葛根湯乾燥エキス……670mg
アセトアミノフェン	400mg	カッコン……2144mg マオウ……1072mg シャクヤク……804mg タイソウ……1072mg カンゾウ……536mg ケイヒ……804mg ショウキョウ……268mg 原生薬として6700mgに相当する。
エテンザミド	400mg	
無水カフェイン	150mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	
チペピジンクエン酸塩	45mg	

添加物として、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム、色素(青色1号、赤色3号、黄色5号)を含有します。

### 〔効能・効果〕

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

### 〔用法・用量〕

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15歳以上)	2カプセル	3 回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないでください	

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部分を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



PTPシート取り出し図

### ＜お問い合わせ先＞

製造販売元 美吉野製薬株式会社

奈良県吉野郡大淀町大岩692

電話 0745-67-0144 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

1904SA