

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

# かぜ薬<sup>塩化リゾチーム配合</sup> ヒストミンエース カプセルS

第②類医薬品

かぜの症状は、日常の生活に支障をきたすばかりではなく、こじらせるといろいろな病気の原因にもなります。早めのお手当が必要です。

ヒストミンエースカプセルSは、鼻やのどの粘膜の炎症をしづめ、粘稠なたんを切れやすくする酵素剤塩化リゾチームや、かぜの不快な症状であるくしゃみ、鼻水、鼻づまりによく効く抗ヒスタミン剤フマル酸クレマスチンをはじめ、発熱、せき、頭痛、のどの痛みなどに効果をあらわす成分を配合し、かぜの諸症状の緩和に優れた効きめを發揮します。

## ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

### 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳祛痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬)

### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある。)

### 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 5. 服用時は飲酒しないこと

### 6. 長期連用しないこと

## ⚑ 相談すること

### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

高熱、排尿困難

- (7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーキンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)

ぜんそく

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
便秘、口のかわき

## 効能

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法・用量

次の1回量を、水又はぬるま湯で食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2カプセル	3回
7才~14才	1カプセル	
7才未満	服用しないで下さい。	

### 〈用法・用量に関する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。  
(3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し

て裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等  
思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量 6カプセル中

成分名	分量	作用
フマル酸 クレマスチン	1.34mg (クレマスチン として1mg)	鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
アセトアミノフェン	900mg	熱をさげ、頭痛や関節・筋肉の痛みを緩和します。
塩化リゾチーム	60mg (力値)	鼻やのどの痛みをしずめます。また、たんを切れやすくします。
リン酸ジヒドロ コデイン	24mg	せき中枢に作用して、せきをしずめます。
dl - 塩酸メチル エフェドリン	60mg	気管支をひろげ、たんを出しやすくなります。
グアヤコール スルホン酸カリウム	240mg	たんを切れやすくなります。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
チアミン ジスルフィド	24mg	ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体。発熱時に消耗の激しいビタミンB <sub>1</sub> を補います。
カンゾウ 乾燥エキス	105mg (カンゾウ 819mgに相当)	のどの痛みをやわらげます。

添加物: 乳糖、セルロース、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、黄色5号、ラウリル硫酸Na

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

## 製品のお問い合わせ先

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 058(278)3933

受付時間 10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

本社所在地

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号