

# 改源感冒カリュー

地竜・カンゾウ・キキョウエキス配合のかぜ薬

第②類医薬品

## 特徴

改源感冒カリューは、発熱や悪寒、頭痛、鼻水、せきなど、かぜの諸症状の緩和に効果をあらわす非ピリン系で、生薬抽出成分を配合した顆粒状のかぜ薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

#### 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

#### 5. 服用前後は飲酒しないでください

#### 6. 長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、頭痛、せき、たん、くしゃみ、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



#### 用法・用量

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	7才以上 ～11才未満	3才以上 ～7才未満	1才以上 ～3才未満	1才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用させないでください

#### <用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

#### 成分・分量

3包(4.8g)中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	作用
地 竜 エ キ ス 散 - N (地竜として420mg)	210mg	温和な解熱作用で、かぜの回復を助けます。
カ ン ゾ ウ エ キ ス 末 (カンゾウとして980mg)	140mg	せきをしずめ、たんを出しやすくし、かぜの回復を助けます。
キ キ ヲ ウ 乾 燥 エ キ ス 末 (キキョウとして1000mg)	200mg	粘稠なたんをうすめて出しやすくし、かぜの回復を助けます。
ア セ ト ア ミ ノ フェ ン	774mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みなどをやわらげます。
ジ ヒ ド ロ コ デ ィ ン リ ン 酸 塩	12mg	せき中枢に働いてせきをしずめます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	45mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
グ ア ヤ コ ー ル ス ル ホ ン 酸 カ リ ウ ム	200mg	気道粘膜についているたんをうすめて出しやすくすると共にせきをしずめます。
ク ロ ル フェ ニ ラ ミ ン マ レ イ ン 酸 塩	7.5mg	かぜの初期にみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみのアレルギー症状をやわらげます。
無 水 カ フ ェ イ ン	112.5mg	頭痛をやわらげます。
○ 添加物として白糖、D-マンニトール、バレイシヨデンプン、ポビドン、ℓ-メントール、チョウジ油、バニリン、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。		

#### 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 1包を分割し服用した残りを使用する場合には、袋の口を折返して保管し、2日以内に服用してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。  
 カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911  
 受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）