

## 解熱鎮痛薬

# 新ツーン® ACE

本剤は、頭痛・歯痛・生理痛・神経痛などの“痛み”や悪寒・発熱時の“熱”に対し、優れた鎮痛効果と解熱効果を発揮するよう、洋薬の良さと漢薬の良さとを取り入れた、解熱鎮痛薬です。

なお、本剤の構成生薬は、漢方処方甲字湯を基本に考えたものです。

### ⚠️ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないこと
4. 長期連用しないこと



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 授乳中の人。  
(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。  
(5) 高齢者。  
(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をすときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### \* 効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛（のどの痛み）・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛  
・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み（ねんざ痛）・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒（発熱によるさむけ）・発熱時の解熱

#### 用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日 の 服 用 回 数
15歳以上	1 包	1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。  
(2) 用法・用量を厳守すること。

#### 成分・分量、作用 1日量2包中に次の成分を含む

成 分	2 包 中	主 な 作 用
ボタンビ末	200mg	炎症や痛みをやわらげます。
シャクヤク末	200mg	痛みをやわらげ、筋肉のこりをほぐします。
ケイヒ末	200mg	熱を下げます。
ショウキョウ末	100mg	体を温める作用や、発汗作用があります。
甘草エキス（カンゾウ500mgに相当）	35mg	のどや歯などの痛みをやわらげます。
地竜エキス散（ジリュウ300mgに相当）	150mg	熱を下げます。
エテンザミド	1000mg	
アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
無水カフェイン	240mg	頭痛をやわらげます。
合成ヒドロタルサイト	540mg	胃粘膜を保護します。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、セルロース、部分アルファー化デンプン、スクラロース、l-メントール、香料、二酸化ケイ素

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先  
田村薬品工業株式会社 お客様相談室 06-6203-5151  
受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**

奈良県御所市西寺田50