

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

解熱鎮痛薬

飲んで効く!

「内服療法」

## 肩こり痛、腰痛、神経痛に コリホン顆粒

《芍薬エキス・甘草エキス・地竜エキス配合》



肩こり痛、腰痛、神経痛の痛みは、自分一人が苦しい思いをし、他人にはわかってもらえない苦しい症状です。その原因は筋肉の疲労、冷え、血圧異常、背骨の異常などさまざまです。その原因を追究し、根治することが望ましいのですが、同時に耐えられない“痛み”の症状をとり除くことが大切です。

《コリホン顆粒》は、これらの症状である：肩こり痛、腰痛、神経痛、筋肉痛等の緩和に優れた効果をあらわす服用し易い顆粒剤です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

##### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

##### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

##### 3. 服用前後は飲酒しないでください

##### 4. 長期連用しないでください



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

裏面も必ずお読みください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【効能・効果】

- 肩こり痛・腰痛・神経痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

#### 【用法・用量】

次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は、6時間以上おいてください。

年 齢	1回量
成人（15歳以上）	1包
11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包
3歳以上7歳未満	1/3包
3歳未満の乳幼児	服用しないでください。

#### ＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分と作用】

1日量〔2包（1包：2g）〕中に次の成分を含有しています。

成 分	分量	作 用
地竜乾燥エキス （原生薬換算量）	260mg (2000mg)	体温調節中枢を鎮静し、体表面の血行をよくし、解熱効果をあらわします。
シャクヤクエキス （原生薬換算量）	200mg (2000mg)	抗炎症作用や鎮けい作用により、筋肉のはげしい痛みにも効果があります。
カンゾウ乾燥エキス （原生薬換算量）	400mg (2000mg)	
アセトアミノフェン	600mg	末梢血管を拡張して血行をよくし、中枢性の解熱・鎮痛効果をあらわします。

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ケイヒ油、ウイキョウ油を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限（外箱及び袋に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 1包を分割して、服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

#### 【その他の注意】

本剤は生薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

#### お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室  
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1  
☎ 0120-415-688  
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

**日新薬品工業株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1