



鎮痛薬「細粒」

解熱鎮痛薬

特 徴

- 非ピリン系の2種類の解熱鎮痛薬の相乗効果により、各種の痛みとつらい発熱を速やかにしずめます。
- 胃粘膜を保護するメタケイ酸アルミン酸マグネシウムとカンゾウを配合。胃にやさしい鎮痛薬です。
- 眠くなる成分が入っていません。
- 速やかに溶け、早く効きます。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないでください。
4. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）
 - (4)高齢者
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6)次の診断を受けた人：心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年齢	1回量	服用回数
15歳以上	1包 	1日2回まで
11歳～14歳	2/3包 	
7歳～10歳	1/2包 	
3歳～6歳	1/3包 	
3歳未満	服用しないこと	



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

成分・分量 1日量(2包)中

成分	含量	はたらき
アセトアミノフェン	600mg	痛みをおさえ、熱を下げます。
エテンザミド	1,000mg	
無水カフェイン	150mg	頭痛をやわらげ、鎮痛効果を増強します。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	400mg	胃液によってゼラチン状の被膜をつくり、胃粘膜を保護します。
カンゾウ乾燥エキス (原生薬 500mg相当)	100mg	痛みをおさえるとともに、胃粘膜を保護します。
シャクヤク乾燥エキス (原生薬 525mg相当)	75mg	鎮痛作用と鎮静作用をあわせもっています。

添加物として、マルチトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口 ☎ 0238(46) 2013
月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く）

販売者 **全国農業協同組合連合会**
東京都千代田区大手町1-3-1

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930