

2014年10月改訂

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

解熱鎮痛薬

第②類医薬品

ノ ー ポ ン



【使用上の注意】



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用や事故が起こりやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)授乳中の人。  
(4)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。  
(5)高齢者。  
(6)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(7)次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

裏面へ続く→

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜ ん そ く	息をすするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛  
(2)悪寒・発熱時の解熱

## 用法・用量

15歳以上(大人)… 1回1包・11歳以上15歳未満 1回 $\frac{2}{3}$ 包  
7歳以上11歳未満 1回 $\frac{1}{2}$ 包・3歳以上7歳未満 1回 $\frac{1}{3}$ 包  
1歳以上3歳未満 1回 $\frac{1}{4}$ 包  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
(2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分・分量 1日量(2包)中

アセトアミノフェン …600mg・エテンザミド … 1,000mg  
無水カフェイン …………… 100mg  
アリルイソプロピルアセチル尿素 …………… 120mg  
添加物としてパレイシドンブ、CMC-Ca、CMC-Na、黄色5号を含有します。

## 保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わったりします。)  
(4)期限の過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **株式会社日参製薬保寿堂**

富山県滑川市高月町581番地

くすり相談窓口 TEL 076-475-0178