

キクマルキン 第②類医薬品

効能又は効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛
 関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛
 打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

15才以上……………1回1包
 1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。

成分及び分量 1日量2包(2000mg)中

アスピリン ……1000mg 添加物として、バレ
 アセトアミノフェン…400mg イソブデンブ、d-
 無水カフェイン ……200mg ホルネオール、無水
 ケイ酸を含有する。

1. 次の人は服用しないこと。

- 注** (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 (3) 15才未満の小児。

- 意** (4) 出産予定日12週以内の妊婦。
 2. 服用に際しては、使用上の注意をよく読むこと。
 3. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

2包(1包1g×2)入 ¥200.



紙 袋、分包

配置期限

登録

商標



痛みどめ
キクマルキン

第②類医薬品

製造販売元

丸太中嶋製薬株式会社
 奈良県御所市今住170

この説明書は本剤とともに保管し
服用に際しては必ずお読みください。

解熱鎮痛薬 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用前後は飲酒しないこと

4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

裏面につづく

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブスジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューとなる、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

3.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。

お問い合わせ先

製造販売元 丸太中嶋製薬株式会社

奈良県御所市今住170 TEL 0745(67)0006