

乗りもの酔いに／酔ってからでも効く



こどもセンパアS液

●●●グレープフルーツ風味●●●

〈乗物酔い薬〉

第2類医薬品

- ◆こどもセンパアS液は、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和し、旅行や遠出を快適で楽しいものにするためのお子さま用の薬です。
- ◆お子さま向きの風味のよい液剤ですので、旅行の途中で気分が悪くなった場合でも、その場で服用できます。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)



- ① 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

- ② 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)



相談すること



- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
 緑内障、心臓病

- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



めまい



吐き気



頭痛

用法・用量

次の量を服用してください。乗物酔いの予防には乗車船の30分前に1回1本を服用してください。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1本を4時間以上の間隔をおき服用してください。

年令	1回量	服用回数
3~10才	1本(20mL) 	1日2回まで
3才未満	服用しないこと	

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

1本(20mL)中

成 分	分 量	はたらき
塩酸メクリジン	12.5mg	嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気をおさえます。
スコボラミン臭化水素酸塩水和物	0.08mg	自律神経の興奮状態を緩和し、めまい・吐き気をおさえます。

添加物：白糖、D-ソルビトール、ポビドン、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



乗物酔いを避けるために、次の点にもご注意ください

バスでは、気分よくすご
しやすい、前方の席や窓
際の席を選びましょう。



飲みすぎや食べすぎは
避けましょう。



おしゃべりや景色をなが
めて、気分よくすごしま
しょう。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)