

乗物酔いによる
めまい・はきけ・頭痛の
予防及び緩和

製造番号

使用期限

エステスピール

乗物酔いに

第2類
医薬品

自動車・飛行機・船・電車等の

乗物酔いに

エステスピール



乗物酔いによる
めまい・はきけ・頭痛の予防及び緩和に

第2類医薬品 【内服液】20mL×2

P-35A-62

- 保管及び取扱い上の注意
1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
 3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

【成分・分量】1日量(2本・40mL)中
 スコバロミン臭化水素酸塩水和物…0.48mg
 クロルフェニラミンマリン酸塩…8mg
 無水カフェイン…100mg
 ※添加物として白糖、クエン酸水和物、安息香酸
 ナトリウム、香料、グリセリン、エタノールを
 含有します。

製造販売元 合名会社 東宝製薬

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地
 お客様相談窓口 ☎058-251-6668
 [10:00~16:00(土、日、祝日を除く)]



乗物酔いに



【効能・効果】
乗物酔いによるめまい、吐き気、頭痛の予防
及び緩和

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(20mL)を服用してください。
乗物酔いの予防には乗車前30分前に1回1本を服用し
ます。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回
1本を4時間以上の間隔をおき服用してください。旧の
服用回数は2回を限度とします。

●定められた用法・用量を厳守してください。

●小児には服用させないでください。

▼ 開封口

エステスピール

第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃痛鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人: 排尿困難(6) 次の診断を受けた人: 緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかき、便秘、眠気、目のかすみ