

服用に際して、この説明書を必ず読んでください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

乗物酔い用薬

第2類医薬品

乗物酔いによるめまい・はきけ・頭痛の予防に

大木製薬の

トリブラプレミアム錠

トリブラプレミアム錠は、乗物酔いの予防を目的とした薬です。服用により、めまい・吐き気・頭痛を防ぎ、旅行を楽しむことができます。

塩酸メクリジンとスコポラミン臭化水素酸塩水和物を1回量の最大基準量を配合し、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防に効果があります。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	泌 尿 器	排尿困難
精神神経系	頭痛	そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防

【用法・用量】

長時間の乗車船の場合、予防を目的として次の量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1錠	1回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 本剤は、定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 本剤は口の中できちんとかきくだいたりせず、そのまま水又はお湯で服用してください。

【成分・分量】 1錠中

成 分	分 量	はたらき
塩酸メクリジン	50mg	内耳器官や嘔吐中枢の興奮を抑えます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.25mg	自律神経の興奮状態を緩和します。
無水カフェイン	20mg	頭痛をやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩	10mg	吐き気をやわらげます。

添加物として乳糖、バレイシヨデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

○乗物酔いの予防のためのワンポイントアドバイス！

- ・十分な睡眠をとり、体調を整えましょう。
- ・旅行の前日、当日は食べ過ぎに注意しましょう。
- ・揺れの少ない場所や換気のよい窓際に座りましょう。
- ・遠くの景色を見たり、おしゃべりをしてリラックスしましょう。
- ・体を締め付けない服装で姿勢を楽にしましょう。

【問い合わせ先】

大木製薬株式会社 03-3256-5051「お客様相談室」まで。

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

発売元

 **大木製薬株式会社**
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造販売元

 **日野薬品工業株式会社**
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

TS1711A