

服用に際して、必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

乗物酔い薬

水なしでも服用できる

フジベター[®]〈細粒〉

◆フジベター[®]は、乗物酔いのめまい・はき気・頭痛の予防や緩和に優れ、イチゴとミントの風味で、携帯に便利なスティック包装です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人	(6)次の症状のある人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人	排尿困難
(3)高齢者	(7)次の診断を受けた人
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人	緑内障、心臓病
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人	
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 心	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

乗物に乗る30分前に、次の1回量を1日2回を限度に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	2回 服用間隔は4時間以上あけること
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
3才以上7才未満	1/3包	
3才未満		服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

2包(1包:1.0g)中

成分	含量	はたらき
塩酸メクリジン	50.0mg	中枢神経の興奮を抑え、めまい、はき気、頭痛をしずめます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.2mg	自律神経のバランスを整え、めまい、はき気を予防します。

添加剤：D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、香料 含有

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)配置期限(使用期限)を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 株式会社 富士薬品(学術室)
電話(048)648-1118 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社 富士薬品**
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地