

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

胃腸薬

緑の胃腸薬 **サーボン**[®] スティックパック(包装)

サーボンは次のような働きをします。

- 制酸剤の働きで胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。更に、ロートエキス[®]の働きで胃液の分泌を抑え、胃酸過多の症状に効果をあらわします。
- 芳香性、苦味性の生薬と制酸剤の働きではきけ、嘔吐、飲みすぎに効果をあらわします。
- 胃のもたれ、胸のつかえをとり去り、胃腸の働きを活発にします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください

👨‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面も必ずお読みください

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ（もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ（過飲）、胃痛

【用法・用量】

次の1回量を、食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
3歳以上5歳未満	1/4包	
3歳未満の乳幼児	服用しないでください。	

＜用法・用量に関する注意＞

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

【成分と作用】

1日量〔3包（1包：1.1g）〕中に次の成分を含有しています。

成分	分量	作用
ロートエキス散	300mg	胃痛をしずめます。
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	600mg	持続的な制酸作用を有します。また胃粘膜の炎症面を保護する働きもあります。
炭酸水素ナトリウム	1200mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。
ショウキヨウ末	200mg	特異な芳香、味のある健胃薬で、胃液や他の消化液の分泌を促し、消化を助けます。
ゲンチアナ末	120mg	

添加物として、乳糖水和物、D-マンニトール、バレイショデンプン、銅クロロフィリンナトリウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール4000、l-メントールを含有します。

＜成分に関する注意＞

本剤の服用により、便が緑がかった色になることがあります。これは本剤に含まれる銅クロロフィリンナトリウムによるもので心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。
5. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎ 0120-415-688
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1