

2013年4月に改訂しました。  
(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

第2類医薬品

## 胃もたれ・胃痛 ロンターゼ胃腸薬K顆粒 〈制酸剤〉

胃は非常にデリケートな臓器で、ストレスや過労、食生活の乱れなどに影響されやすく、早めのケアが大切です。

ロンターゼ胃腸薬K顆粒は、過剰な胃酸分泌を抑えて胃痛や胸やけを鎮めるとともに、荒れた胃粘膜を保護・修復し、さらに健胃生薬の莪朮・桂皮が胃腸機能を改善します。爽やかな香りと味の2顆粒剤で、胃もたれ、胃痛、胸やけなどの不快な胃腸症状によく効きます。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください

#### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、高血圧、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状  |
|---------------------|--|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ、胃痛

## 用法・用量

次の用法・用量を守り、食間又は食後に服用してください。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1包      | 3回     |
| 15歳未満の小児  | 服用しないこと |        |

※食間とは食後2～3時間を指します。

## 成分・分量

ロンターゼ胃腸薬K顆粒は、3包(4.5g)中に下記の成分・分量を含有します。

| 成分・分量                               | はたらき                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| アズレンスルホン酸ナトリウム……6mg<br>(水溶性アズレン)    | 胃粘膜に作用して、炎症をしずめ、荒れた胃粘膜を修復します。         |
| アルジオキサ……300mg                       | 制酸作用を有するとともに、胃粘膜に作用して荒れた胃粘膜を修復・保護します。 |
| グリチルリチン酸二カルウム……51mg                 | 胃粘膜の炎症をしずめます。                         |
| 合成ヒドロタルサイト……1,200mg                 | 速やかで、しかも持続的な制酸作用があります。                |
| 炭酸水素ナトリウム……600mg                    | 過剰な胃酸を中和します。                          |
| ロートエキス散……300mg<br>(ロートエキスとして……30mg) | 胃液の分泌を調節するとともに、胃の痛みをしずめます。            |
| ガジュツ(莪述)末……200mg                    | ショウガ科ガジュツの根茎で、芳香健胃薬として用いられています。       |
| ケイヒ(桂皮)末……200mg                     | クスノキ科桂樹の樹皮で、芳香健胃薬として用いられています。         |

添加物として、トウモロコシデンプン、カルメロース、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ℓ-メントールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

**日本製薬工業株式会社**  
愛知県小牧市小木東一丁目186