

胃腸薬 マナミンS

この説明文書は服用前に必ずお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品



【使用上の注意】



してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

- 次の人¹は服用しないでください
透析療法を受けている人
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
- 授乳中の人²は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳中に移行して乳児の脈が速くなることもある。)
- 長期連用しないこと



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- 服用後次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
口のかわき、便秘、下痢
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回 (毎食後)
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
8歳未満	服用させないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法及び用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】〔1日量3包(3.6g)中〕

成分	含量	はたらき
炭酸水素ナトリウム 炭酸マグネシウム 沈降炭酸カルシウム	900mg 300mg 600mg	即効性に胃酸を中和し、痛みや胸やけを改善します。
乾燥水酸化アルミニウムゲル	600mg	持続的な制酸作用を有し、胃粘膜保護作用もあります。
ロートエキス	30mg	胃の緊張をやわらげ、胃酸分泌を抑制します。
ビオチンアスターゼ700	150mg	主として糖質の消化を助け吸収を促進します。

添加物：ケイヒ末、L-メントール、カンゾウ末、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】

1.2g(1包)×30包

【お問い合わせ先】

鶴原製薬株式会社 医薬情報部
(9~17時、月~金曜日：祝日を除く)
TEL 072-761-1456 (代表)



製造販売元
鶴原製薬株式会社
大阪府池田市豊島北1丁目16番1号