

フレキソ用
版下

1

パンシロン胃腸内服液

第3類医薬品

【用法・用量】
服用に際しては処方
事項を良くお読み下
さい。

【服用上の注意】
【相薬すること】

1. 医師の診断を受けている人は、服用前に医師、
薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
2. 飲酒後から服用しても効果が得られない
場合は服用を中止し、本剤を持って医師、薬
劑師又は登録販売者にご相談下さい。

【効能・効果】
ほろけ、口乾、喉乾のむかつき、胃のむか
つき、悪心、食欲不振、胸やけ、胸つかえ、嘔吐、
胃もたれ、食慾不振、消化不良、食べすぎ、胃弱、
胃痛、便秘、泄瀉

【成分・分量】1瓶(30mL)中
カンゾウエキス 75mg(原生薬換算量 500mg)、
ニンジン根茎エキス 15mg(原生薬換算量 225mg)、
キツネエキス 50mg(原生薬換算量 250mg)、チ
ンピエキス 50mg(原生薬換算量 250mg)、ケイ
ヒクタン 0.25mL(原生薬換算量 50mg)、オレン
ジエキス 0.15mL(原生薬換算量 150mg)、ゲン
チアナ根エキス 0.1mL(原生薬換算量 100mg)、
カハエニン抽出液 75mg(添加物としてチンツ
液、センブリエキス、トメントール、フルカンチ
プロピレングリコールエステル、白糖、ロソリビ
トール、1,2-エタン、安息香酸Na、ステアール、
クエン酸Naを含有します。

ロート製薬 お客さま安心サポートデスク
TEL:06-8758-1230
受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

飲みすぎ・二日酔いのムカムカに

パンシロン[®]
胃腸内服液

生薬配合

**天然生薬
エキス
の
効き目**

30mL
ROHTO

第3類医薬品

【用法・用量】
15才以上1歳1瓶を1日
2回服用して下さい。
服用期間中は期間以上上
げて下さい。なお、15才
未満の方は服用しない
下さい。

※本剤は生薬成分を配
合しているため、まれに
アレルギーを生じることが
ありますが、品質に影響は
ありません。よく読んでか
ら服用して下さい。

【保管及び取扱上の注意】
【1】直射日光の当たらない
涼しい所に保管して下さい。
【2】子供の手の届かぬ
所に保管して下さい。
【3】開封後は速やかに服用
して下さい。開封後1ヶ月
が経過した場合はなるべく早くご
使用下さい。

発売元
ロート製薬株式会社
大阪府生野区箕面1-8-1
製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町南879
6K22

使用期限
製造番号

4

2

ε

仕上がり寸法 52X90.48