

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、食べ過ぎ、食欲不振(食欲減退)、胃弱、消化不良、嘔吐、飲み過ぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1日1回1本(30mL)を食後服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 生薬成分を含むため、わずかに沈殿を生じることがありますが薬効に変わりありません。よく振って服用すること。

AL03

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

薬草の胃腸薬

サロミン 内服液

胃弱、消化不良、はきけ
(二日酔・悪酔のむかつき)

第3類医薬品

30mL

【成分・分量】1日量1本(30mL)中
オウバクエキス…100mg(オウバク
300mgに相当)、ケイヒエキス…45mg(ケ
イヒ1000mgに相当)、ウイキョウエキ
ス…31.5mg(ウイキョウ300mgに相当)、
カンゾウエキス…200mg(カンゾウ
800mgに相当)、ニンジンエキス…
60mg(ニンジン667mgに相当)、ショ
ウキョウエキス…58.2mg(ショウキョウ
600mgに相当) 添加物:ハチミツ、安
息香酸Na、バラベン、エタノール、香
料、L-メントール、クエン酸水和物、ク
エン酸Na水和物、D-ソルビトール、
ブドウ糖果糖液糖、パニンリン

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

金属:キャップ、ガラス:瓶

配置
期限

製造
番号