

使用上の注意  
(相談すること)

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること  
● 医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること  
● 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

(効能・効果)

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐。

(用法・用量)

成人1回1瓶(30mL)1日2回服用  
服用間隔は4時間以上おくこと。  
● 用法及び用量を厳守すること。



ガラス:瓶  
金属:キャップ

ラベル 30mL

製造販売元

日本医薬品製造株式会社  
奈良県御所市古瀬18番地  
お問い合わせ先 電話0745-67-0015

第2類医薬品

二日酔のむかつき・飲み過ぎに

ニチイ  
胃腸内服液



医薬品

(成分・分量)

1日量(1瓶30mL×2)中

オウバク軟弱エキス (原生薬として600mg)	200mg
ショウキョウエキス (原生薬として840mg)	150mg
ケイヒエキス (原生薬として880mg)	40mg
ウイキョウエキス (原生薬として500mg)	100mg
チンピエキス (原生薬として500mg)	100mg
人参エキス (原生薬として666mg)	60mg
DL-塩化カルニチン	150mg

添加物としてカンゾウエキス、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、L-アスパラギン酸Na、 $\beta$ -メントール、ポリオキシエチレングリセリントリオキシステアリン酸60、安息香酸Na、パラベン、香料を含有する。

●本品は生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効にかわりはありません。よく振ってから服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

使用期限

Lot.