

第3類医薬品

日本薬局方

吉見ケツメイシ



⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヶ月位（便秘に服用する場合は5～6日間）服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

整腸（便通を整える）、腹部膨満感、便秘


用法及び用量

成人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮詰め、かすをこして取り去り、食前又は食間3回に分服する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください
- 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください
- 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください
- 服用に際しては、説明文をよくお読みください

LOT.

 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠しているとおもわれる人。
2. 1ヶ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

▲ 用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mLをもって約400mLに煮つめ、汁をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。

(用法・用量に関する注意)

◎服用に際して、定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

▲ 効能及び効果

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、便秘

▲ 保管及び取り扱いの注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 開封後はなるべく早く使用し、長く放置しないでください。
- (5) 煎薬の場合は、腐敗防止のため煎液を冷所に保管してください。
- (6) 本品には防虫防カビのため脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。
- (7) 服用に際しては、説明文をよくお読みください。

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、本品は天然物(生薬)の性質上、吸湿してカビが生えたり、虫がつくことがあります。万一不良品がございましたら開封後でもお取替えいたします。

吉見製薬株式会社

大阪府中央区船越町2-1-17

電話 06(6941)7164

