

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

※第3類医薬品

食べすぎ・もたれに アウス消化薬

食物は、消化液に含まれる消化酵素により、しだいに消化され、やがて吸収されていきます。しかし、胃腸の働きが弱まると、消化が十分に行われなくなって、食欲もなくなります。

アウス消化薬は胆汁末とウコン末、それに消化酵素を配合した胃腸薬で、消化を促進して食べすぎ、もたれに効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)2週間位服用しても症状がよくなる場合

■適 応 症



食べすぎ



もたれ



消化不良



食欲不振

食べすぎ（過食）、もたれ（胃もたれ）、消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感

裏面もお読みください。☞

■用法・用量

次の1回量を1日3回食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15才以上)	5錠	3回
11~14才	4錠	
8~10才	3錠	
5~7才	2錠	
5才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成 分

成 分	15錠中	作 用
胆汁末	300mg	胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化吸収を助けます。
ウコン末	200mg	
ピオチアスターゼ2000	45mg	複合消化酵素で食物に直接作用して消化を助けます。

添加物として乳糖、セルロース、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ビンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

■包 装

(ビン入) 150錠、450錠

■お問い合わせ先

森田薬品工業株式会社 お客様相談室

※電 話：(084) 943-8171

※受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



森田薬品工業株式会社

広島県福山市大門町野々浜1059番地

本社 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

※副作用被害救済制度
☎0120-149-931