

服用前に、この説明文をよくお読みください。

第3類医薬品

胃腸薬 ハイウルソU

■使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

■効能

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

■用法・用量

成人(15才以上)1回1本(30mL)、1日2回を限度とし服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

●15才未満は服用しないでください。●定められた用法・用量を厳守してください。

製造販売元 **佐藤製薬株式会社**
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
電話 03(5412)7393

sato

第3類医薬品

飲みすぎ、 食欲不振、二日酔い・ 悪酔いのむかつき

ハイウルソU

ウルソデオキシコール酸配合

■成分・分量 2本(60mL)中

ウコン流エキス	1mL (1,000mg)
ニンジン流エキス	1mL (1,000mg)
ソウジュツ流エキス	1mL (1,000mg)
ショウキョウ流エキス	0.6mL (600mg)
ゲンチアナ流エキス	1mL (1,000mg)
ケイヒ流エキス	1mL (1,000mg)
アカメガシワエキス	100mg (1,000mg)
ウルソデオキシコール酸	40mg

()内は原生薬換算量

添加物として、ハチミツ、白糖、カラメル、デキストリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、安息香酸Na、dl-リンゴ酸、香料(エチルバニリン、バニリンを含む)、pH調整剤を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

製造記号