

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類  
医薬品

複合胃腸薬

食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけに

# パンジラス顆粒

消化酵素・健胃生薬配合

すっきりしたのみごちの顆粒タイプ。消化酵素と健胃生薬（淡褐色の顆粒）に制酸剤（白色の顆粒）を配合し、消化を助け、弱った胃腸の動きを高めます。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢





4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 〔効能・効果〕

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

### 〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、毎食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包 	3回
11才以上15才未満	2/3包 	
8才以上11才未満	1/2包 	
5才以上8才未満	1/3包 	
5才未満	服用しないでください	×



#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

（裏面もお読みください。）

**〔成分・分量〕**

パンジラス顆粒は成人1日量3包（1包：1200mg）中に次の成分を含んでいます。

	成分	3包中	働き
消化薬	ピロチンアスターゼ1000 プロザイム	90mg 18mg	アンプン、タンパク質の消化を助けます。
健胃生薬	ホミカエキス散 （ホミカエキス センブリ末 1-メントール	200mg 20mg 10mg 20mg	苦味、芳香健胃生薬により、唾液や胃液の分泌が促進され、弱った胃腸をととのえます。のみごこちはすっきり。
制酸薬	炭酸水素ナトリウム 炭酸マグネシウム	1500mg 440mg	胃酸を中和します。

添加物として、デキストリン、パレイショアンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン及び乳糖を含有します。

**〔保管及び取扱い上の注意〕**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。



胃は健康のバロメータです。

ストレスや不規則な食事  
でいつも胃の調子が悪く、  
食欲がない。



ちょっと胃がもたれてむ  
かついたり食が進まなかつ  
たりする。



ふだんあまり胃が丈夫で  
なくいつも胃が気になる。



このような方は本剤を服用されるほか、日常生活でも次の点にご注意ください。

暴飲暴食に気をつけましょ  
う。



上手なストレス解消法を見  
つけましょう。



お問い合わせ先

第一薬品工業株式会社 くすり相談窓口  
電話番号：076-435-5055  
受付時間：午前9時から午後4時30分まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

発売元

**① 白石薬品株式会社**  
〒567-0005 大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元

**第一薬品工業株式会社**  
〒931-8515 富山県富山市草島15-1