

この説明文書はお薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

胃のもたれ 胸やけ 飲みすぎ
インホームグリーン胃腸薬

第2類
医薬品

インホームグリーン胃腸薬は、現代の食生活に対応できるようつくられた胃腸薬で、次のような特長があります。

- ・たんぱく及びでんぷんの消化力に加えて、脂肪の消化力を高めています。
- ・各種制酸性を組み合わせて、速効性かつ持続性の胃酸調整効果と、強い胃粘膜保護作用を有します。
- ・各種健胃生薬の作用により、弱った胃腸の働きを助け、その機能を回復させます。
- ・緑と褐色の二色散剤で、味と香りがよく、サラサラとした舌ざわりでのみやすくなっています。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください

相談すること ㊦

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。
排尿困難
(7)次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

次の量を食後に水又は温湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人 (15才以上)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

1日量(3包)中

(1包量1200mg)

成 分	分量	作 用	
制 酸 剤	合成ヒドロタルサイト	600mg	持続的な制酸作用を有し、かつ胃粘膜の炎症面を保護する働きもあります。また、合成ヒドロタルサイトは速効性もかね備えています。
	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	450mg	
消 化 酵 素 剤	炭酸水素ナトリウム	600mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善します。
	ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして30mg)	90mg	鎮痙鎮痛作用があり、胃の異常な緊張をはずめ、胃の機能を正常にし、胃腸の痛みを抑えます。また胃酸の分泌を抑制します。
消 化 酵 素 剤	ピオザスターゼ2000	60mg	広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の補給をよくします。
	リパーゼAP6	60mg	脂肪消化酵素で、強力な消化作用をあらわします。
健 胃 生 薬	ウイキョウ末	30mg	芳香性の健胃生薬で、特有の芳香が味覚を刺激し、食欲を増進させ、また胃腸の働きをよくします。
	ケイヒ末	180mg	
健 胃 生 薬	チョウジ末	30mg	苦味健胃生薬で上と同様の作用があります。
	ゲンチアナ末	90mg	
粘 膜 修 復 剤	センブリ末	5mg	胃粘膜の炎症をはずめ、胃壁を保護します。
	カンゾウ末	150mg	
粘 膜 修 復 剤	銅クロロフィリンナトリウム	48mg	胃粘膜の炎症をはずめ、胃壁を保護します。

添加物として、カルメロース、アラビアゴム、ヒドロキシプロピルセルロース、バレイショデンプン、デキストリン、乳糖水和物、ステアリン酸ポリオキシル、ℓ-メントールを含有しています。

〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室
〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10 電話：076-478-5580
受付時間：9：00～16：00（土、日、祝祭日を除く）

発売元



株式会社 新生オリエックス社
埼玉県さいたま市北区宮原町2-48-6

製造販売元

TOA 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10