

服用の前に容器の説明文を必ずお読みください。

販売名 胃散M

第3類医薬品

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量 4.5g(大人1日服用量)中

炭酸水素ナトリウム ……1800mg ウイキョウ末 ……50mg
 沈降炭酸カルシウム ……1500mg ショウキョウ末 ……20mg
 炭酸マグネシウム ……380mg ニガキ末 ……10mg
 ケイヒ末 ……500mg チンピ末 ……10mg

【添加物】軽質無水ケイ酸、カンゾウ末、L-メントール、キシリトール、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、バレイシヨデンパン

効能・効果 胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)

製造販売元 富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175

お客様相談窓口 ☎076-435-0139
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



芳香性健胃制酸薬

胃腸薬

胃酸過多、胸やけ、
胃部不快感、胃もたれに

散剤

胃散M

制酸剤(炭酸水素ナトリウム、
沈降炭酸カルシウム、
炭酸マグネシウム)、
生薬ケイヒ末等5成分配合

210g

第3類医薬品

販売名 胃散M

第3類医薬品

用法・用量 次の量を、食後水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上(大人)	1.5g(1サジ)	1日3回
11才以上 15才未満	1.0g(2/3サジ)	
8才以上 11才未満	0.75g(1/2サジ)	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 定められた用法・用量を守ってください。
- 添付のサジをご使用のうえ、使用後は清潔に保管してください。

〈保管及び取扱上の注意〉

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため)
- 使用期限(缶の底部に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

