


共立胃腸丸DX

第3類
医薬品

 **使用上の注意** この面の説明をよく読むこと。



■相談すること

次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

1. 医師の治療を受けている人。
2. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐。

【用法・用量】

1包(30粒入)

成人(15歳以上)	1回	30粒
11歳以上15歳未満	1回	20粒
8歳以上11歳未満	1回	15粒
5歳以上8歳未満	1回	10粒
3歳以上5歳未満	1回	7粒

いずれも1日3回食前または食後に服用する。

 **用法及び用量に関連する注意**

1. 定められた用法用量を守ること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 本剤は3才未満の乳幼児に服用させないこと。なお、3才以上であっても幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

【成分・分量】

1日量(90粒)中


日局	センブリ末	50mg
日局	オウレン末	180mg
日局	オウバク末	900mg
日局	オウゴン末	900mg
日局	ケイヒ末	900mg
日局	カンゾウ末	400mg

添加物：寒梅粉、カルメロースカルシウム、デヒドロ酢酸ナトリウム、バレイショデンプン、薬用炭、タルク、アラビアゴム末

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

お問い合わせ先
製造販売業者

 共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷 1085 番地

お客さま相談室 0744-52-4741

受付時間 9：00～17：00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

0120-149-931(フリーダイヤル)